DIRECTION GENERALE DE
 LA FONCTION PUBLIQUE

DIRECTION DES CONCOURS

CONCOURS PROFESSIONNEL D'ACCES AU CYCLE DE FORMATION

De Professeur de Collège Bivalent (SVT – Physique Chimie)

Session du 31 janvier 2015

EPREUVE	DUREE	COEFFICIENT
Physique Chimie	1 heure	3

EXERCICE 1

(10 pts)

On souhaite étudier la trajectoire du centre d'inertie G d'un dauphin pendant son saut hors de l'eau. Le repère d'étude est (O,i,j) tel que indiqué par le schéma ci-dessous.

On choisit comme origine des dates l'instant où le centre d'inertie G du dauphin est confondu avec le point O. Le vecteur vitesse initiale $\vec{V}_0$ est dans le plan (Oxy) et est incliné d'un angle α de 60° par rapport à l'axe Ox. La valeur de la vitesse initiale est de 10 m/s et pour les calculs on prendra $g = 10 \text{ m/s}^2$. Le dauphin n'est soumis qu'à son poids et sa masse est notée m.

- 1) En appliquant la deuxième loi de Newton, donner l'expression du vecteur accélération $\vec{a}_G$ du centre d'inertie puis ses coordonnées a_x et a_y dans le repère d'étude.
- 2) En déduire l'expression littérale de la coordonnée $V_x(t)$ du vecteur vitesse du centre d'inertie en fonction de la vitesse initiale V_0 et de l'angle α puis celle de la coordonnée $V_y(t)$ en fonction de V_0 , α , g et t .
- 3) Calculer la vitesse atteinte après 1 seconde de saut.

EXERCICE 2

(10 pts)

Une solution de méthylamine CH_3NH_2 de concentration molaire $C_b = 0,2 \text{ mol/L}$ a un $\text{pH} = 12$.

- 1) Écrire l'équation-bilan de la réaction de CH_3NH_2 avec l'eau.
- 2) Calculer toutes les concentrations molaires de toutes les espèces chimiques présentes dans la solution.
- 3) Calculer la constante d'acidité K_A du couple $\text{CH}_3\text{NH}_3^+/\text{CH}_3\text{NH}_2$.

CORRIGE EPREUVE DE SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIE (Niveau I, Sujet 1)

EXERCICE 1 (10 pts) ⇒ (10 pts)

1) Expressions de a_G , a_x et a_y

Schéma

1 pt

Bilan des forces : poids P du dauphin

- direction verticale
- orienté vers le bas (descendant)
- appliqué au centre de gravité du dauphin
- intensité $P = m \cdot g$

Le poids P étant la seule force extérieure appliquée au dauphin alors :

$P = m \cdot \vec{g} = m \cdot \vec{a}_G$ soit $a_G = g$ (expression vectorielle) 1 pt
 Par projection sur (Ox) et sur (Oy) on obtient : $a_x = 0$ et $a_y = g$ 1 pt

2) Expressions de $V_x(t)$ et $V_y(t)$

$a_x = 0$ donc $V_x(t) = cte = V_{0x} = V_0 \cdot \cos \alpha$ 1 pt
 $a_y = g$ donc $V_y(t) = g \cdot t + cte$ avec $cte = V_{0y} = V_0 \cdot \sin \alpha$ 1 pt

En définitive :

$V_x(t) = V_0 \cdot \cos \alpha$ 1 pt
 $V_y(t) = g \cdot t + V_0 \cdot \sin \alpha$ 1 pt

3) Pour $t = 1$ s (application numérique)

$V_x = 5$ m/s et $V_y = 18,65$ m/s 2 pts
 $V = (V_x^2 + V_y^2)^{1/2} = 19,31$ m/s 1 pt

EXERCICE 2 (10 pts) ⇒ (10 pts)

1) Equilibre acido-basique

2) Espèces présentes en solution : CH_3NH_2 , $CH_3NH_3^+$, OH^- et H_3O^+

pH = 12 donc $[H_3O^+] = 10^{-12}$ mol/L 1,5 pt

Produit ionique de l'eau ($K_e = 10^{-14}$) : $[OH^-] = K_e / [H_3O^+] = 10^{-2}$ mol/L 1,5 pt

Electro-neutralité de la solution : $[H_3O^+] + [CH_3NH_3^+] = [OH^-]$

$$[CH_3NH_3^+] = [OH^-] = 10^{-2} \text{ mol/L}$$

1,5 pts

Conservation de la matière : $C_b = 2 \cdot 10^{-1} = [CH_3NH_2] + [CH_3NH_3^+]$

$$[CH_3NH_2] = 2 \cdot 10^{-1} \text{ mol/L}$$

1,5 pts

3) Calcul de K_A

$$K_A = [CH_3NH_2] \cdot [H_3O^+] / [CH_3NH_3^+] = 2 \cdot 10^{-11}$$

2 pts