

Exercice 1 :

Calculer

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = \binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \dots + (-1)^n \binom{n}{n}$$

On pourra utiliser la formule du binôme.

Allez à : [Correction exercice 1 :](#)

Exercice 2 :

Démontrer que pour tout $n, p, k \in \mathbb{N}$, $n \geq p \geq k$

$$\binom{n}{k} \binom{n-k}{p-k} = \binom{p}{k} \binom{n}{p}$$

Calculer

$$\sum_{k=0}^p \binom{n}{k} \binom{n-k}{p-k}$$

Allez à : [Correction exercice 2 :](#)

Exercice 3 :

Démontrer par récurrence les assertions suivantes :

1.

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \sum_{k=0}^n (k+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

2.

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

3.

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad 3 \text{ divise } n^3 - n$$

Allez à : [Correction exercice 3 :](#)

Exercice 4 :

On pose

$$S(n) = \sum_{k=0}^n k^3 = 1^3 + 2^3 + \dots + n^3$$

Montrer par récurrence que pour tout $n \geq 1$

$$S(n) = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

Allez à : [Correction exercice 4 :](#)

Exercice 5 :

1. Montrer par récurrence que, pour tout $n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

On posera $S(n) = \sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + \dots + n$

2. En déduire la valeur de

$$T(n) = \sum_{k=n+1}^{2n} k = (n+1) + (n+2) + \dots + (2n-1) + 2n$$

Allez à : [Correction exercice 5 :](#)

Exercice 6 :

Soit pour tout entier naturel $n \geq 1$, on pose

$$T_n = \sum_{k=1}^n k 2^{k-1}$$

Montrer que pour tout $n \geq 1$

$$T_n = 1 + (n-1)2^n$$

Allez à : [Correction exercice 6 :](#)

Exercice 7 :

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$.

$$S_n = 1 \times 2 + 2 \times 3 + \dots + (n-1) \times n$$

Montrer que pour tout $n \geq 2$ on a :

$$S_n = \frac{1}{3}n(n-1)(n+1)$$

Allez à : [Correction exercice 7 :](#)

Exercice 8 :

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=n}^{2n} k = \frac{3}{2}n(n+1)$$

Allez à : [Correction exercice 8 :](#)

Exercice 9 :

Montrer que pour tout entier $n \geq 1$

$$\sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{1}{2^{2n}}$$

Allez à : [Correction exercice 9 :](#)

Exercice 10 :

Soient $m, n \in \mathbb{N}$, $m \leq n$. Montrer sans calculs que

$$\binom{m}{m} + \binom{m+1}{m} + \dots + \binom{n}{m} = \binom{n+1}{m+1}$$

En utilisant la formule pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\binom{n-k+1}{m+1} = \binom{n-k}{m} + \binom{n-k}{m+1}$$

Allez à : [Correction exercice 10 :](#)

Exercice 11 :

Montrer que le produit de 4 entiers consécutifs augmenté de 1 est le carré d'un entier.

On pourra calculer $n(n+3)$ et $(n+1)(n+2)$.

Allez à : [Correction exercice 11 :](#)

Exercice 12 :

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$, n^2 divise $(n+1)^n - 1$. On pourra utiliser la formule du binôme.

Allez à : [Correction exercice 12 :](#)

Exercice 13 :

Calculer

$$\sum_{k=1}^n k C_n^k$$

Allez à : [Correction exercice 13 :](#)

Exercice 14 :

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $1(1!) + 2(2!) + \dots + n(n!) = (n+1)! - 1$

Allez à : [Correction exercice 14 :](#)

Exercice 15 :

On considère la fonction f (fonction d'Ackermann) de deux variables m et n dans $\mathbb{N}$ définie par :

$$f(0, n) = n + 1 \quad (1)$$

$$f(m, 0) = f(m-1, 1) \quad \text{pour } m \geq 1 \quad (2)$$

$$f(m, n) = f(m-1, f(m, n-1)) \quad \text{pour } m \geq 1 \text{ et } n \geq 1 \quad (3)$$

Montrer que :

1. $\forall k \in \mathbb{N}, f(1, k) = k + 2$
2. $\forall k \in \mathbb{N}, f(2, k) = 2k + 3$
3. $\forall k \in \mathbb{N}, f(3, k) = 2^{k+3} - 3$

Allez à : [Correction exercice 15 :](#)

Exercice 16 :

On considère l'application de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ définie pour tout (n, m) de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ par :

$$g(n, m) = \frac{(n+m)(n+m+1)}{2} + m$$

1. Montrer que si deux couples (n_1, m_1) et (n_2, m_2) de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ vérifiant $n_1 + m_1 < n_2 + m_2$, alors on a $g((n_1, m_1)) < g((n_2, m_2))$
2. Montrer que g est injective.
3. Montrer que g est surjective.
4. En déduire que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ est dénombrable.

Allez à : [Correction exercice 16 :](#)

CORRECTIONS

Correction exercice 1 :

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n (-1)^k 1^{n-k} \binom{n}{k} = (-1+1)^n = 0$$

Allez à : [Exercice 1 :](#)

Correction exercice 2 :

1.

$$\binom{n}{k} \binom{n-k}{p-k} = \frac{n!}{k! (n-k)!} \times \frac{(n-k)!}{(p-k)! ((n-k) - (p-k))!} = \frac{n!}{k!} \times \frac{1}{(p-k)! (n-p)!}$$

Et

$$\binom{p}{k} \binom{n}{p} = \frac{p!}{k! (p-k)!} \times \frac{n!}{p! (n-p)!} = \frac{1}{k! (p-k)!} \times \frac{n!}{(n-p)!}$$

Ce qui montre que pour tout $n, p, k \in \mathbb{N}, n \geq p \geq k$.

$$\binom{n}{k} \binom{n-k}{p-k} = \binom{p}{k} \binom{n}{p}$$

2.

$$\sum_{k=0}^p \binom{n}{k} \binom{n-k}{p-k} = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} \binom{n}{p} = \binom{n}{p} \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} = \binom{n}{p} \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} 1^k \times 1^{p-k} = \binom{n}{p} (1+1)^p = 2^p \binom{n}{p}$$

Allez à : **Exercice 2 :**

Correction exercice 3 :

1. Pour $n = 0$,

$$\sum_{k=0}^0 (k+1) = 1 = \frac{(0+1)(0+2)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

L'égalité est vérifiée pour $n = 0$.

Montrons que l'égalité au rang n entraîne celle au rang $n+1$

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} (k+1) &= \sum_{k=0}^n (k+1) + ((n+1)+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2} + (n+2) = \frac{((n+1)+2)(n+2)}{2} \\ &= \frac{((n+1)+1)((n+1)+2)}{2} \end{aligned}$$

C'est bien le cas donc pour tout $n \in \mathbb{N}$.

$$\sum_{k=0}^n (k+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

2. Pour $n = 0$,

$$\sum_{k=0}^0 k^2 = 0^2 = 0 = \frac{0 \times (0+1)(2 \times 0 + 1)}{6} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

L'égalité est vérifiée pour $n = 0$.

Montrons que l'égalité au rang n entraîne celle au rang $n+1$

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} k^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = (n(2n+1) + 6(n+1)) \frac{(n+1)}{6} \\ &= (2n^2 + 7n + 6) \frac{(n+1)}{6} \end{aligned}$$

Première méthode le polynôme du second degré $2X^2 + 7X + 6$ a pour discriminant

$$\Delta = 7^2 - 4 \times 2 \times 6 = 49 - 48 = 1$$

Et pour racines

$$X_1 = \frac{-7-1}{2 \times 2} = -2 \quad \text{et} \quad X_2 = \frac{-7+1}{2 \times 2} = -\frac{3}{2}$$

Donc

$$2X^2 + 7X + 6 = 2(X + 2)\left(X + \frac{3}{2}\right) = (X + 2)(2X + 3)$$

Ce qui entraîne que $2n^2 + 7n + 6 = (n + 2)(2n + 3)$, par conséquent

$$\sum_{k=0}^{n+1} k^2 = (n + 2)(2n + 3) \frac{(n + 1)}{6} = \frac{(n + 1)((n + 1) + 1)(2(n + 1) + 1)}{6}$$

Ce qui montre l'égalité au rang $n + 1$, on a donc pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n + 1)(2n + 1)}{6}$$

Deuxième méthode

On veut montrer que

$$\sum_{k=0}^{n+1} k^2 = \frac{(n + 1)((n + 1) + 1)(2(n + 1) + 1)}{6} = \frac{(n + 1)(n + 2)(2n + 3)}{6}$$

Et on a

$$\sum_{k=0}^{n+1} k^2 = (2n^2 + 7n + 6) \frac{(n + 1)}{6} = \frac{(n + 1)(2n^2 + 7n + 6)}{6}$$

On développe $(n + 2)(2n + 3)$

$$(n + 2)(2n + 3) = 2n^2 + 3n + 4n + 6 = 2n^2 + 7n + 6$$

Ce qui montre l'égalité au rang $n + 1$, on a donc pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=0}^n k^2 = \frac{n(n + 1)(2n + 1)}{6}$$

3. Pour $n = 0$, 3 divise 0 car il existe $k = 0 \in \mathbb{N}$ tel que $0 = 3 \times 0$ donc 3 divise $0 = 0^3 - 0$
Montrons que 3 divise $n^3 - n$ (c'est-à-dire qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $3k = n^3 - n$) entraîne que 3 divise $(n + 1)^3 - (n + 1)$

$$(n + 1)^3 - (n + 1) = n^3 + 3n^2 + 3n + 1 - n - 1 = n^3 + 3n^2 + 2n$$

Or $3k = n^3 - n \Leftrightarrow n^3 = 3k + n$, donc

$$(n + 1)^3 - (n + 1) = 3k + n + 3n^2 + 2n = 3(n^2 + n + k)$$

Ce qui montre que 3 divise $(n + 1)^3 - (n + 1)$, on a :

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, 3 divise $n^3 - n$.

Allez à : **Exercice 3 :**

Correction exercice 4 :

$$S(1) = 1^3 = 1$$

Et

$$\frac{1^2(1 + 1)^2}{4} = 1$$

L'égalité est vraie au rang 1.

$$S(n + 1) = 1^3 + 2^3 + \dots + n^3 + (n + 1)^3 = S(n) + (n + 1)^3$$

En utilisant l'égalité au rang n

$$S(n+1) = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = (n+1)^2 \left[\frac{n^2}{4} + n + 1 \right] = \frac{(n+1)^2(n^2 + 4n + 4)}{4} \\ = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$$

L'égalité au rang n entraîne celle au rang $n+1$ donc pour tout $n \geq 1$ on a

$$1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

Allez à : **Exercice 4 :**

Correction exercice 5 :

1. On appelle (H_n) l'égalité

$$\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + \dots + n$$

Si $n = 1$, $\sum_{k=1}^1 k = 1$ et $\frac{1 \times (1+1)}{2} = 1$ sont égaux donc (H_1) est vraie.

$$\sum_{k=1}^{n+1} k = 1 + 2 + \dots + n + (n+1) = [1 + 2 + \dots + n] + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + n + 1 \\ = (n+1) \left[\frac{n}{2} + 1 \right] = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

Donc (H_n) entraîne (H_{n+1}) . L'égalité est vraie pour tout $n \geq 1$.

2. On remarque que $S(2n) = 1 + 2 + \dots + n + (n+1) + \dots + 2n = \frac{2n(2n+1)}{2} = n(2n+1)$

$$T(n) = S(2n) - S(n) = n(2n+1) - \frac{n(n+1)}{2} = n \left[2n + 1 - \frac{n+1}{2} \right] = \frac{n(3n+1)}{2}$$

Autre correction

$$T(n) = \sum_{k=n+1}^{2n} k = (n+1) + (n+2) + \dots + (2n-1) + 2n \\ = [n + n + \dots + n] + [1 + 2 + \dots + (n-1) + n] = n^2 + \frac{n(n+1)}{2} \\ = \frac{2n^2 + n(n+1)}{2} = \frac{n(2n+n+1)}{2} = \frac{n(3n+1)}{2}$$

Allez à : **Exercice 5 :**

Correction exercice 6 :

$$T_1 = \sum_{k=1}^1 k 2^{k-1} = 1 \times 2^{1-1} = 1 = 1 + (1-1)2^1$$

L'égalité est vraie pour $n = 1$.

Montrons que l'égalité au rang n entraîne celle au rang $n+1$.

$$T_{n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} k 2^{k-1} = \sum_{k=1}^n k 2^{k-1} + (n+1)2^n = 1 + (n-1)2^n + (n+1)2^n = 1 + (n-1+n+1)2^n \\ = 1 + 2n2^n = 1 + (n+1-1)2^{n+1}$$

Donc pour tout $n \geq 1$

$$\sum_{k=1}^n k 2^{k-1} = 1 + (n-1)2^n$$

Allez à : Exercice 6 :

Correction exercice 7 :

Pour $n = 2$, $S_2 = 1 \times 2 = 2$ et

$$\frac{1}{3}n(n-1)(n+1) = \frac{1}{3} \times 2(2-1)(2+1) = 2$$

L'égalité est vraie pour $n = 2$.

Montrons que l'égalité au rang n entraîne celle au rang $n + 1$.

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= 1 \times 2 + 2 \times 3 + \dots + (n-1) \times n + n \times (n+1) = \frac{1}{3}n(n-1)(n+1) + n(n+1) \\ &= \frac{1}{3}n(n+1)(n-1+3) = \frac{1}{3}(n+1)((n+1)-1)((n+1)+1) \end{aligned}$$

Donc pour tout $n \geq 2$ on a

$$S_n = \frac{1}{3}n(n-1)(n+1)$$

Allez à : Exercice 7 :

Correction exercice 8 :

Pour $n = 0$

$$\sum_{k=0}^{2 \times 0} k = 0$$

Et

$$\frac{3}{2}n(n+1) = \frac{3}{2} \times 0 \times (0+1) = 0$$

Donc l'égalité est vérifiée pour $n = 0$.

Montrons que l'égalité au rang n entraîne celle au rang $n + 1$.

$$\begin{aligned} \sum_{k=n+1}^{2(n+1)} k &= \sum_{k=n+1}^{2n+2} k = (n+1) + (n+2) + \dots + 2n + (2n+1) + (2n+2) \\ &= \sum_{k=n}^{2n} k - n + (2n+1) + (2n+2) = \frac{3}{2}n(n+1) + 3n + 3 = \frac{3}{2}n(n+1) + 3(n+1) \\ &= \frac{3}{2}(n+1) \left(n + \frac{2}{3} \times 3 \right) = \frac{3}{2}(n+1)(n+2) \end{aligned}$$

L'égalité au rang n entraîne celle au rang $n + 1$ donc

$$\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=n}^{2n} k = \frac{3}{2}n(n+1)$$

Autre méthode :

On peut utiliser l'identité

$$\begin{aligned} \sum_{k=n}^{2n} k &= \sum_{k=1}^{2n} k - \sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{1}{2}(2n)(2n+1) - \frac{1}{2}(n-1)n = \frac{1}{2}n(2(2n+1) - (n-1)) \\ &= \frac{1}{2}n(4n+2-n+1) = \frac{1}{2}n(3n+3) = \frac{3}{2}n(n+1) \end{aligned}$$

Allez à : Exercice 8 :

Correction exercice 9 :

Première méthode

$$\sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^n} \sum_{k=0}^n \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2^n} \frac{1 - \frac{1}{2^{n+1}}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{2^{n-1}} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) = \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{1}{2^{2n}}$$

Deuxième méthode : par récurrence

Pour $n = 1$

$$\sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{2^k} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} = \frac{3}{4}$$

$$\frac{1}{2^{n-1}} - \frac{1}{2^{2n}} = \frac{1}{2^0} - \frac{1}{2^2} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

Montrons que cette égalité au rang n entraîne celle au rang $n + 1$.

$$\begin{aligned} \sum_{k=n+1}^{2(n+1)} \frac{1}{2^k} &= \sum_{k=n+1}^{2n+2} \frac{1}{2^k} = -\frac{1}{2^n} + \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{2n+1}} + \frac{1}{2^{2n+2}} = -\frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{1}{2^{2n}} + \frac{1}{2^{2n+1}} + \frac{1}{2^{2n+2}} \\ &= \frac{-1+2}{2^n} + \frac{-4+2+1}{2^{2n+2}} = \frac{1}{2^n} + \frac{-1}{2^{2n+2}} = \frac{1}{2^{(n+1)-1}} - \frac{1}{2^{2(n+1)}} \end{aligned}$$

Ce qui est bien l'égalité au rang $n + 1$.

Allez à : Exercice 9 :

Correction exercice 10 :

$$\binom{n-k+1}{m+1} = \binom{n-k}{m} + \binom{n-k}{m+1} \quad (1)$$

Pour $k = 0$

$$\binom{n+1}{m+1} = \binom{n}{m} + \binom{n}{m+1} \quad (2)$$

Pour $k = 1$

$$\binom{n+1}{m+1} = \binom{n}{m} + \binom{n-1}{m} + \binom{n-1}{m+1}$$

Pour $k = 2$

$$\binom{n+1}{m+1} = \binom{n}{m} + \binom{n-1}{m} + \binom{n-2}{m} + \binom{n-2}{m+1}$$

Montrons par récurrence que pour $l \in \{0, \dots, n-m-1\}$ que :

$$\binom{n+1}{m+1} = \binom{n}{m} + \binom{n-1}{m} + \dots + \binom{n-l}{m} + \binom{n-l}{m+1} \quad (3)$$

Pour $l = 0$ c'est l'égalité (2), (pour visualiser les choses on a écrit les formules pour $l = 1$ et $l = 2$).

Utilisons l'égalité (1) avec $k = l + 1$

$$\binom{n-l}{m+1} = \binom{n-l-1}{m} + \binom{n-l-1}{m+1}$$

Ce que l'on remplace dans le dernier terme de (3)

$$\binom{n+1}{m+1} = \binom{n}{m} + \binom{n-1}{m} + \dots + \binom{n-l}{m} + \binom{n-l-1}{m} + \binom{n-l-1}{m+1} \quad (3)$$

Cela achève la récurrence puis on prend $l = n-m-1 \Leftrightarrow n-l = m+1$

$$\binom{n+1}{m+1} = \binom{n}{m} + \binom{n-1}{m} + \dots + \binom{m+1}{m} + \binom{m+1}{m+1} = \binom{n}{m} + \binom{n-1}{m} + \dots + \binom{m+1}{m} + \binom{m}{m}$$

$$\text{Car } \binom{m+1}{m+1} = 1 = \binom{m}{m}$$

Allez à : Exercice 10 :

Correction exercice 11 :

$$n(n+3) = n^2 + 3n \text{ et } (n+1)(n+2) = n^2 + 3n + 2$$

4 entiers consécutifs s'écrivent $n(n+1)(n+2)(n+3)$

Donc

$$\begin{aligned} n(n+1)(n+2)(n+3) + 1 &= [n(n+3)][(n+1)(n+2)] + 1 = [n^2 + 3n][n^2 + 3n + 2] + 1 \\ &= [(n^2 + 3n + 1) - 1][(n^2 + 3n + 1) + 1] + 1 = (n^2 + 3n + 1)^2 - 1 + 1 \\ &= (n^2 + 3n + 1)^2 \end{aligned}$$

$n^2 + 3n + 1$ est un entier donc $n(n+1)(n+2)(n+3) + 1$ est le carré d'un entier.

Allez à : Exercice 11 :

Correction exercice 12 :

$$(n+1)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k n^k 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n C_n^k n^k = C_n^0 + \sum_{k=1}^n C_n^k n^k = 1 + \sum_{k=1}^n C_n^k n^k$$

Donc $(n+1)^n - 1 = \sum_{k=1}^n C_n^k n^k$, pour $n \geq 2$:

$$\sum_{k=1}^n C_n^k n^k = C_n^1 n + C_n^2 n^2 + \dots + C_n^n n^n = n^2 + n^2(C_n^2 + \dots + C_n^n n^{n-2})$$

Donc n^2 divise $(n+1)^n - 1$.

Allez à : Exercice 12 :

Correction exercice 13 :

Première méthode :

$$\sum_{k=0}^n k C_n^k = \sum_{k=1}^n \frac{kn!}{k!(n-k)!} = \sum_{k=1}^n \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} = n \sum_{k=1}^n \frac{(n-1)!}{(k-1)!((n-1)-(k-1))!}$$

On pose $k' = k - 1$, si $k = 1$ alors $k' = 0$ et si $k = n$ alors $k' = n - 1$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n k C_n^k &= n \sum_{k'=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{k'!((n-1)-k')!} = n \sum_{k=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{k!((n-1)-k)!} = n \sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k = n \sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k 1^k 1^{n-1-k} \\ &= n(1+1)^{n-1} = n2^{n-1} \end{aligned}$$

Autre correction sans utiliser les sommes.

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^n kC_n^k &= 1 \times C_n^1 + 2 \times C_n^2 + 3 \times C_n^3 + \dots + (n-1)C_n^{n-1} + nC_n^n \\
&= 1 \times \frac{n!}{(n-1)!1!} + 2 \times \frac{n!}{(n-2)!2!} + 3 \times \frac{n!}{(n-3)!3!} + \dots + (n-1) + n \frac{n!}{(n-n)!n!} \\
&= n \frac{(n-1)!}{(n-1)!0!} + n \frac{(n-1)!}{((n-1)-1)!1!} + n \frac{(n-1)!}{((n-1)-2)!2!} + \dots \\
&\quad + n \frac{(n-1)!}{((n-1)-(n-2))!(n-2)!} + n \frac{(n-1)!}{((n-1)-(n-1))!(n-1)!} \\
&= n \left[\frac{(n-1)!}{(n-1)!0!} + \frac{(n-1)!}{((n-1)-1)!1!} + \frac{(n-1)!}{((n-1)-2)!2!} + \dots \right. \\
&\quad \left. + \frac{(n-1)!}{((n-1)-(n-2))!(n-2)!} + \frac{(n-1)!}{((n-1)-(n-1))!(n-1)!} \right] \\
&= n[C_{n-1}^0 + C_{n-1}^1 + C_{n-1}^2 + \dots + C_{n-1}^{n-2} + C_{n-1}^{n-1}] \\
&= n[C_{n-1}^0 1^0 1^{(n-1)-0} + C_{n-1}^1 1^1 1^{(n-1)-1} + C_{n-1}^2 1^2 1^{(n-1)-2} + \dots + C_{n-1}^{n-2} 1^{n-2} 1^{(n-1)-(n-2)} \\
&\quad + C_{n-1}^{n-1} 1^{n-1} 1^{(n-1)-(n-1)}] = n(1+1)^{n-1} = n2^{n-1}
\end{aligned}$$

Deuxième méthode :

$$f(x) = (x+1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k 1^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k$$

On dérive ces deux expressions de f

$$n(x+1)^{n-1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} kx^{k-1} \Leftrightarrow n(x+1)^{n-1} = \sum_{k=0}^n C_n^k kx^{k-1}$$

On prend alors $x = 1$

$$n(1+1)^{n-1} = \sum_{k=0}^n C_n^k k1^{k-1} \Leftrightarrow n2^{n-1} = \sum_{k=0}^n C_n^k k$$

Allez à : **Exercice 13 :**

Correction exercice 14 :

On appelle (H_n) l'égalité $1(1!) + 2(2!) + \dots + n(n!) = (n+1)! - 1$

Si $n = 1$ on a $1(1!) = (1+1)! - 1 = 2! - 1 = 1$, l'égalité est vérifiée.

$$\begin{aligned}
1(1!) + 2(2!) + \dots + n(n!) + (n+1)(n+1)! &= [1(1!) + 2(2!) + \dots + n(n!)] + (n+1)(n+1)! \\
&= [(n+1)! - 1] + (n+1)(n+1)! = (n+1)!(1+n+1) - 1 = (n+2)! - 1
\end{aligned}$$

Donc (H_n) entraîne (H_{n+1}) , donc (H_n) est vraie pour tout $n > 0$.

Allez à : **Exercice 14 :**

Correction exercice 15 :

1. On appelle (H_k) l'égalité $f(1, k) = k + 2$

$$f(1,0) = f(0,1) = 1 + 1 = 2 = 0 + 2$$

La première égalité vient de (2) et la seconde vient de (1)

On suppose que l'on a (H_k)

$$f(1, k+1) = f(0, k+2) = k+2+1 = k+3 = (k+1) + 2 \text{ donc } (H_k) \text{ entraîne } (H_{k+1})$$

Donc (H_k) est vraie pour tout k .

2. On appelle (H'_k) l'égalité $f(2, k) = 2k + 3$.

$$f(2,0) = f(1,1) = 1 + 2 = 3 = 2 \times 1 + 1$$

La première égalité vient de (2), la seconde du 1)

Donc (H'_1) est vraie.

$$f(2, k+1) = f(1, f(2, k)) = f(1, 2k+3) = 2k+3+2 = 2(k+1)+3$$

La première égalité vient de (3), la seconde de l'hypothèse de récurrence et la troisième du 1).

Donc (H'_k) entraîne (H'_{k+1}) , l'égalité est vraie pour tout $k \geq 0$.

3. On appelle (H''_k) l'égalité $f(3, k) = 2^{k+3} - 3$

$$f(3, 0) = f(2, 1) = 2 \times 2 + 1 = 5 = 8 - 3 = 2^3 - 3$$

La première égalité vient de (2), la seconde vient du 2).

Donc (H''_1) est vraie.

$$f(3, k+1) = f(2, f(3, k)) = f(2, 2^{k+3} - 3) = 2(2^{k+3} - 3) + 3 = 2^{k+4} - 6 + 3 = 2^{(k+1)+3} - 3$$

La première égalité vient de (3), la seconde de l'hypothèse de récurrence et la troisième du 2).

Donc (H''_k) entraîne (H''_{k+1}) , l'égalité est vraie pour tout $k \geq 0$.

Allez à : **Exercice 15 :**

Correction exercice 16 :

$$\frac{(n+m)(n+m+1)}{2} = 1 + 2 + \dots + (n+m) = \sum_{k=1}^{n+m} k$$

1. Pour faire une démonstration propre il faut faire deux cas

$$\begin{aligned} & n_1 + m_1 + 1 < n_2 + m_2 \\ g((n_2, m_2)) - g((n_1, m_1)) &= 1 + 2 + \dots + (n_2 + m_2) + m_2 - (1 + 2 + \dots + (n_1 + m_1)) - m_1 \\ &= \sum_{k=1}^{n_2+m_2} k + m_2 - \sum_{k=1}^{n_1+m_1} k - m_1 \\ g((n_2, m_2)) - g((n_1, m_1)) &= 1 + 2 + \dots + (n_1 + m_1) + \dots + (n_2 + m_2) - (1 + 2 + \dots + (n_1 + m_1)) + m_2 - m_1 \\ &= \sum_{k=n_1+m_1+1}^{n_2+m_2} k + m_2 - m_1 \\ g((n_2, m_2)) - g((n_1, m_1)) &= (n_1 + m_1 + 1) + \dots + (n_2 + m_2) + m_2 - m_1 \\ &= \sum_{k=n_1+m_1+1}^{n_2+m_2} k + m_2 - m_1 \\ g((n_2, m_2)) - g((n_1, m_1)) &= (n_1 + 1) + \dots + (n_2 + m_2) + m_2 \\ &= \sum_{k=n_1+m_1+2}^{n_2+m_2} k + n_1 + m_1 + 1 + m_2 - m_1 \\ g((n_2, m_2)) - g((n_1, m_1)) &= (n_1 + 1) + \dots + (n_2 + m_2) + m_2 = \sum_{k=n_1+m_1+2}^{n_2+m_2} k + n_1 + 1 + m_2 > 0 \end{aligned}$$

Donc $g((n_2, m_2)) > g((n_1, m_1))$

Deuxième cas

$$\begin{aligned} & n_1 + m_1 + 1 = n_2 + m_2 \\ g((n_2, m_2)) - g((n_1, m_1)) &= 1 + 2 + \dots + (n_2 + m_2) + m_2 - (1 + 2 + \dots + (n_1 + m_1)) - m_1 \\ &= \sum_{k=1}^{n_2+m_2} k + m_2 - \sum_{k=1}^{n_1+m_1} k - m_1 \end{aligned}$$

$$g((n_2, m_2)) - g((n_1, m_1)) = (n_1 + m_1 + 1) + m_2 - m_1 = n_1 + 1 + m_2 > 0$$

$$\text{Donc } g((n_2, m_2)) > g((n_1, m_1))$$

2. La contraposée de

$$g((n_2, m_2)) = g((n_1, m_1)) \Rightarrow (n_2, m_2) = (n_1, m_1)$$

Est

$$(n_2, m_2) \neq (n_1, m_1) \Rightarrow g((n_2, m_2)) \neq g((n_1, m_1))$$

Premier cas

Si $n_1 + m_1 < n_2 + m_2$ alors $g((n_2, m_2)) > g((n_1, m_1))$ et donc $g((n_2, m_2)) \neq g((n_1, m_1))$

Si $n_1 + m_1 > n_2 + m_2$ alors $g((n_2, m_2)) < g((n_1, m_1))$ et donc $g((n_2, m_2)) \neq g((n_1, m_1))$

Si $n_1 + m_1 = n_2 + m_2$ avec $n_1 \neq n_2$ et $m_1 \neq m_2$ (en effet $n_1 \neq n_2 \Leftrightarrow m_1 \neq m_2$ car $n_1 + m_1 = n_2 + m_2$)

Alors

$$g((n_2, m_2)) - g((n_1, m_1)) = m_2 - m_1 \neq 0$$

Donc g est injective.

3. Le problème est le suivant, pour tout $p \in \mathbb{N}$ existe-t-il un couple $(n, m) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ tel que

$$p = g((n, m))$$

Remarque préliminaire :

Pour tout $p \in \mathbb{N}$ il existe un unique $N \in \mathbb{N}$ tel que

$$1 + 2 + \dots + N = \frac{N(N+1)}{2} \leq p < 1 + 2 + \dots + N + (N+1) = \frac{(N+1)(N+2)}{2}$$

Car la suite $\left(\frac{N(N+1)}{2}\right)_{N \in \mathbb{N}}$ est une suite strictement croissante.

On pose $m = p - \frac{N(N+1)}{2}$ et $n = N - \left(p - \frac{N(N+1)}{2}\right)$ (Ne me demander pas pourquoi, c'est parce que cela marche, j'espère que vous verrez pourquoi par la suite).

n et m ont été choisis de façon à ce que $n + m = N$


$$g((n, m)) = g\left(\left(N - \left(p - \frac{N(N+1)}{2}\right), p - \frac{N(N+1)}{2}\right)\right) = \frac{N(N+1)}{2} + p - \frac{N(N+1)}{2} = p$$

Et voilà le travail !

g est surjective.

4. g est une bijection de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ sur $\mathbb{N}$ donc $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ est dénombrable. On rappelle qu'un ensemble est dénombrable s'il existe une bijection entre lui-même et $\mathbb{N}$.

Remarque : Sur une figure cette fonction g est élémentaire alors que lorsqu'on regarde sa « tête » elle n'est pas très sympathique.



La valeur de $g(n, m)$ se situe en bas à droite des rectangles, on met 0 en (0,0), on revient sur les abscisses en (1,0) on compte en diagonale vers en haut à droite 1,2, on revient sur les abscisses et on compte 3,4,5... Ainsi on voit que l'on peut « compter » tous les éléments de $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ un par un sans en oublier.

Allez à : Exercice 16 :